

Observation
Sur une hernie ombilicale
Par
Le S.^r J. J. Belloc maître
Es arts, Lieutenant de M.
Le premier chirurgien du
Roi.
à Agen sur Garonne



ARC 15 d. 56, n° 1

Observation

Sur une hernie ombilicale

Il est si peu d'observations qui ne laissent quelque chose à désirer, qu'on seroit quelque fois tenté de croire que la plus-part des auteurs les donnent plutôt pour s'en faire honneur que pour les rendre utiles.

Afin de me mettre à l'abri de ce reproche, je me suis décidé à donner le bulletin de la maladie qui fait le sujet de celle que j'ai l'honneur de communiquer à l'Académie. Cette manière me semble la plus propre à remplir l'objet qu'on doit se proposer en donnant une observation en matière de maladie. J'avoue que le détail en est plus long, mais si c'est quelquefois un défaut il cesse de l'être lors qu'il a pour but de ne rien taire d'essentiel; Or je regarde comme tel la suite non interrompue de tous les phénomènes et des changements qui arrivent dans le cours d'une maladie.

Je n'ai pas cru moins utile d'y joindre en détail tous les moyens mis en usage pour combattre les accidens à fur et mesure qu'ils se sont présentés: Cela m'a paru d'autant plus essentiel, qu'il arrive souvent qu'on prend, ou qu'on donne comme dépendants de la maladie des phénomènes qui ne sont dûs qu'aux remèdes, ce qui peut devenir une source de méprises et d'erreurs.

Je prie l'Académie de me pardonner des réflexions que je ne me suis permises que pour excuser le long détail, peut être en effet trop minutieux, dans le quel je suis entré dans cette observation qui m'a paru à plusieurs égards digne de lui être offerte.



Madame de Sxx Sxx habitante de la ville —
d'agen étoit âgée de cinquante quatre ans, d'une
complexion avantageuse et d'un tempérament sanguin-
bilieux. Sa sensibilité tant physique que morale étoit au dessus
de toute expression.

Elle fut mariée jeune et mère de six enfans. toutes ses
grossesses ainsi que ses couches furent heureuses et elles
n'eurent jamais aucune fâcheuse suite.

L'estomac étoit sa partie faible. il y avoit plusieurs
années qu'elle étoit sujete à un vomissement périodique.
Ce vomissement revenoit chaque mois et il durait, à peu près
autant de tems, c'est-à-dire un mois. Pendant sa durée madame
maigrissoit extraordinairement et elle reprenoit son
embonpoint ordinaire dans le cours des intervalles.

il y avoit environ trois ans que cette dame s'étoit
aperçue d'une petite tumeur à l'ombilic qui la fatiguoit
de tems à autre. on reconnut que c'étoit une exomphale
qui se réduisoit assés aisément. et on employa un tres léger
bandage, parceque madame ne pouvoit point supporter
d'avoir son ventre serré; mais il parut suffisant et elle
le portoit depuis ce tems là.

Quoi qu'il y eut déjà trois ou quatre ans que son
vomissement périodique eut cessé, néanmoins le moindre
écart dans le régime, soit pour la qualité, soit pour
la quantité des alimens, le lui étoit encore, mais il
étoit passager et de peu de durée.

Cel avoit été l'état de cette dame jusques à l'époque
de la maladie dont il va être question.

Le 12. avril 1787, à la suite d'une indigestion,
cette respectable dame eut une diarrhée dans la nuit et
elle fut copieusement du ventre. Vers les sept heures du
matin la diarrhée cessa et il lui succéda un violent
vomissement qui continua jusques vers les trois heures de
l'après midi. D'abord il ne parut pas que la tumeur
herniaire eut augmenté en volume, quoi que madame

ressentit quelque douleur au nombril; mais on observa qu'il pouvoit bien y avoir déjà un pincement, ou étranglement, malgré que la tumeur ne parut pas plus considérable, attendu que cette Dame étoit si grasse, que les seuls tegumens avoient dans cet endroit deux pouces et demi d'épaisseur. quoiqu'il en soit, le doute sur la cause étoit fondé, ce qui fit différer d'abord la saignée.

Environ une heure après que le vomissement eut commencé, on s'aperçut que la hernie avoit considérablement augmenté en volume et la malade y éprouvoit déjà une douleur vive, ce qui obligea de recourir à la saignée qui fut répétée trois fois dans cette journée.

La tumeur étoit peu élevée et plate, mais elle avoit trois pouces de diamètre.

On appliqua des cataplasmes anodins; Madame prit des potions huileuses; on lui servit plusieurs lavemens; elle fut plongée dans le bain, et quoique la tumeur conservât toujours son volume apparent, le vomissement cessa, ainsi que nous l'avons déjà dit, vers les trois heures après midi. Cependant la douleur se faisoit toujours ressentir quoique moins forte, et continua toute la nuit malgré les secours les mieux indiqués. Il ne fut jamais possible de diminuer la tumeur par le taxis.

Le second jour la douleur étoit presque nulle et nous reconnûmes que la hernie étoit une simple épiplocephale. La cessation du vomissement et de la douleur, les rugosités, ainsi qu'une espèce d'emplacement qu'offroit la tumeur, fondèrent ce jugement; cependant malgré tous les huileux pris intérieurement et injectés en lavement, le ventre ne se vidoit point.

On observera que cette Dame venoit de faire très exactement son carême, qu'elle étoit naturellement fort constipée et que depuis que sa hernie se montra pour la première fois, elle prenoit chaque jour quelque lavement.

Madame but deux verrees d'un dilutum de casse aiguise avec le sel de Glaubert. La première fut rejetée, la seconde fut gardée; mais elle ne voulut plus en prendre à cause d'une repugnance insurmontable qu'elle en éprouva.

La nuit suivante fut très calme: les lavemens entraînent quelque peu de matière, en partie délayée et en partie par pelotons.



La grande diminution de la douleur, la tranquillité du poulx, la langue humide et peu limoneuse, la sérénité de la figure, un peu de diminution dans la tumeur; tout cela nous donna, et étoit fait pour donner, ce semble, le plus grand espoir.

Le troisième jour on donna pour boisson ordinaire une dissolution de crème de tartre étendue dans l'eau commune; — nulle évacuation, mais quelque colique et des borborèmes qui firent espérer que le ventre s'ouvreroit. vain espoir; rien ne parut par là.

Le soir madame vomit des matières qui donnoient une odeur désagréable. La nuit suivante fut cependant plus calme qu'on n'avoit osé l'espérer après un tel vomissement. Sur le matin madame vomit abondamment des matières fécales très délayées et ce vomissement se renouvela deux fois dans la journée. Elle en fut très alarmée, ainsi que nous, qui ne sommes à quoi l'attribuer: l'effet, étoit-ce à un nouveau pincement de l'intestin? ou bien à l'effet de la crème de tartre et à la grande propension de la malade au vomissement? judicium difficile. L'absence de la douleur à l'ombilic et l'extrême sensibilité de la malade nous firent adopter la dernière idée. En conséquence pour tâcher d'émousser la sensibilité et rectifier les mouvements désordonnés de l'estomac et des intestins, on se détermina à donner deux grains d'opium de deux en deux heures; madame en prit ainsi deux grains. La nuit et la journée suivantes furent très calmes. La malade nous dit même le lendemain qu'elle se trouvoit sensiblement mieux et qu'il lui sembloit qu'elle mangeroit s'il lui étoit permis.

L'état du poulx, de la langue, des yeux et de toute la figure avoit toujours été et étoit encore très satisfaisant; mais les évacuations alvines étant toujours nulles, on introduisit de la fumée de tabac par l'anus et peu de temps après on servit un lavement simple qui fut rendu teint en jaune et entraîna quelque peu d'une matière semblable à de la terre glaise.

Dans la nuit du quatrième au cinquième jour madame vomit cinq fois une matière liquide stercorale moins infecte que celle qui avoit été rejetée par les vomissements précédents.

Le cinquième jour au matin, on se décida à ouvrir la

tumeur; mais suivant les principes, on essaya auparavant le taxis. Cette nouvelle tentative nous parut des plus heureuses; la disparition de la tumeur, ou pour mieux dire sa réduction à son volume ordinaire, accompagnée d'un gargouillement que deux medecins, deux chirurgiens et plusieurs autres personnes présentes entendirent très distinctement et enfin le mouvement très sensible que je sentis sous mes doigts; tout cela étoit fait sans doute pour nous persuader et nous convaincre que la rentrée des parties essentielles avoit eu lieu: Nous le crûmes en effet avec d'autant plus de confiance que dès ce moment madame ne ressentit plus un tiraillement qui s'étendoit depuis le cartilage xiphoïde jus qu'au pubis dont elle se plaignoit auparavant.

Néanmoins les évacuations alvines furent attendues en vain. On servit un lavement avec le vin et l'huile d'olive aiguise avec le fel de cuisine; à celui là on en fit succéder plusieurs autres emollients qui n'eurent pas plus de succès.

On se decida à faire prendre un minoratif composé de manne, de casse et de sel de Glauber qui fut pris vers les quatre heures du soir. Dans la nuit madame vomit très abondamment une matiere très delayée couleur d'ocre d'une odeur très aigre.

Le 7^e jour un des consultants proposa le mercure coulant. L'inutilité de tous les moyens déjà mis en usage, la presque-certitude que nous avions de la rentrée de l'intestin; d'ailleurs la situation de la malade dont le pouls, la langue et la figure étoient dans le meilleur état, et enfin la cessation des douleurs et des tiraillements depuis le taxis; tout cela nous faisant croire que des matieres endurcies étoient la cause la plus vraisemblable de cette situation, nous nous rendîmes à cet avis et madame en prit six onces en trois fois dans le cours de la journée.

Le pouls parut élevé sur la soir; une selle jaune avec un grumeau demi fondu de la grosseur d'un marron fut toute l'évacuation par embas qui fut produite ce jour là et la nuit suivante.

La nuit fut tranquille quoi qu'il parut quelque léger



vomissement.

Le 8^e jour à la visite du matin nous trouvâmes le poulx bien réglé et assés ample, la langue tres humectée et point chargée, le ventre souple, les yeux et la figure assés bons, mais madame étoit plus accablée que de coutume.

On fit passer un minoratif en deux verrées et par tous del'huile dedin tirée sans feu pour aider l'action du mercure. madame vomit copieusement vers les deux heures de l'après-midi, et ayant éprouvé une envie de pousser une selle, elle rendit quelques mucquosités nageantes dans environ une coque d'oeuf d'une eau faumâtre.

Le soir le poulx seerra, la figure changea defavorablement, la nuit fut accompagnée d'angoisses, de tres grandes inquiétudes et de plusieurs vomissements.

Le 9^e jour à la visite du matin nous trouvâmes la figure, ainsi que le poulx revenus à leur état naturel, mais le vomissement continuant toujours, nous nous decidâmes à faire l'operation comme seul moyen qui nous restoit, tant pour mettre l'art à l'abri de tout reproche que pour connoître à travers l'obscurité de tous ces signes la véritable cause d'un mal aussi bizarre.

Après avoir fait l'incision à la peau, nous trouvâmes un trousseau d'épiploon tres adhérent à la peau et à toutes les autres parties environnantes. Je ne me servis que des doigts pour penetrer à travers cette masse ^{grasseuse} ~~chaude~~ que je déchirai avec les ongles. ayant penetré environ un ponce de profondeur, cette masse me parut moins compacte, ou pour mieux dire les parties n'étoient que affairées les unes contre les autres. J'enfonçai le doigt index qui passa aisement jus qu'à la profondeur de deux ponces et demi sans remonter aucune partie contenue. En faisant cependant des recherches cà et là, j'engageai le bout de mon doigt dans un vide que je pris d'abord pour l'anneau ombilical, mais en l'enfonçant un peu plus et autant que la longueur de ~~cette~~ mon doigt peut me le permettre du côté du cartilage

xiphoides, je sentis parfaitement que j'avois pénétré dans un tube; je dirigeai ensuite mon doigt vers le pubis et je reconnus également que j'avois enfilé un autre tube, d'où j'inferai que la paroi supérieure de l'angle formé par l'anneau de l'intestin pincé étoit percée; mais cette conjecture me parut bientôt invraisemblable parce que aucune matière n'en sortit. Je priai un confrère qui étoit à mon côté de faire des recherches à son tour, et en dirigeant son doigt suivant l'idée que je lui en donnai, il avoua que ce que j'avois dit étoit exactement vrai, et il ajouta qu'il pénétrait alternativement dans le tube supérieur et inférieur sans sortir son doigt de la même ouverture.

Cette singularité me parut mériter réflexion avant de pousser plus loin la manœuvre, et les adhérences dont la destruction me parut ensuite aussi dangereuse que difficile à exécuter, acheva de me persuader que le meilleur parti à prendre étoit de livrer le cœcum pour quelques moments à la sagesse et aux forces de la nature.

En conséquence on ^{mit} ~~mettait~~ le premier appareil, mais à peine eut-on enfoncé un bourdonnet bridé dans la plaie qu'il en sortit un jet continu de matière fécale très liquide qui inonda la malade.

Tous les assistants en furent effrayés et la malade même en fut si alarmée, qu'elle demanda qu'on lui administrât l'extreme-onction, ce qui fut fait tout de suite.

Il n'y eut que moi qui étois persuadé et qui crus pouvoir assurer qu'il ne pouvoit arriver rien de plus heureux pour le salut de la malade, et dès ce moment je conçus l'état des choses; ce qui fut vérifié par la suite.

Le pincement comprenoit la paroi supérieure de l'anneau a, b, voyez la fig. Le pincement étoit tel que presque tout le tube de l'intestin y étoit compris.

Tout ce qui étoit pincé étoit tombé en mortification. Ce qui rendoit cette partie de la paroi flasque et molasse.



Les deux tubes que nous rencontrâmes étoient supérieurement en c, et inférieurement en d; c'est à dire les deux branches de l'ance.

La flaccidité de la partie gangrenée l'obligeoit de céder à l'impulsion du bout du doigt de manière à n'être point sentie, d'autant plus que comme nous étions obligés de tendre extraordinairement le doigt pour y atteindre, cette extrême tension diminuoit la faculté du tact.

Quelqu'un m'objecta qu'il étoit difficile d'expliquer ce phénomène d'après l'idée que je me formois de la chose.

Pour résoudre ^{cette} difficulté ~~je crus devoir répondre~~ ~~à cette objection~~ je crus devoir répondre que vraisemblablement tout autant que cette paroi gangrenée avoit été soutenue par les parties environnantes les matières n'avoient ~~eu~~ vainement fait résistance qu'elle empruntoit principalement de ces parties contre lesquelles elle appuyoit; mais que cet appui lui manquant après la dilatation, et en outre après avoir été froissée par nos doigts, il étoit bien naturel de croire qu'elle avoit cédé à l'impulsion des matières. Cela paroît d'autant plus vrai qu'il ne sortit aucun grumeau de matière capable d'avoir obstrué l'intestin.

Dans le premier moment de cette évacuation le poulx se serra, et les extrémités se refroidirent, ce qui ne doit être attribué qu'à la crainte et à l'alarme, puis que ayant été rassurée, tout reprit son état naturel.

On prescrivit une potion avec la confectiō alherimē delayée dans une infusion de quina acidulée avec l'esprit de vitriol; et on employa à l'extérieur une decoction de quina camphrée. La nuit suivante fut très calme.

Le 10^e jour madame éprouvoit des besoins très rapprochés de prendre de la nourriture, aussi voyoit elle toujours avec le plus grand plaisir les momens où l'on devoit lui présenter du bouillon. On lui injecta des bouillons en lavemens tant

Dans la vue de la nourrir, que pour entretenir la capacité des —
intestins inférieurs dans le cas où la nature procureroit l'altération
de celles qui étoient dans la consolidation de la croûte.

Dans la nuit du 10^e jour madame éprouva des douleurs
à l'estomac jusques vers les trois heures du matin et depuis ce
moment elle dormit d'un bon sommeil pendant quatre heures de suite.

Cette douleur fut attribuée aux bouillons trop forts : on les
affoiblit et la malade ne ressentit plus ces douleurs.

Jusques au 19^e jour tout fut dans l'état le plus calme. Ce
jour là madame éprouva des gonflemens d'entrailles qui, pour
la première fois, furent suivis de la sortie des vents par l'anus,
et les matières fécales qui sortoient par la playe étoient plus
épaisses et moins abondantes.

Le 22^e jour madame grossa trois petites selles très
liquides, de couleur cendrée et bien fétides.

Le 25^e jour les matières occasionnèrent une inflammation
à la peau tout au tour de la playe dont les douleurs étoient
par tems intolérables. Cette irritation sembla même procurer
des excréments de matière et plus abondantes et plus fréquentes.

D'où pouvoit provenir l'agacement que les matières
fécales ne recommencerent à produire à la peau que le vingt-
cinquième jour après l'opération, et après avoir cessé jusqu'à
ce tems sans occasionner la moindre irritation ? Étoient elles
devenues plus acres, ~~ou~~ ou bien les parties avoient elles acquis
un plus haut degré de sensibilité ?

1^o Il y avoit deux ans environ que les menstrues avoient
cessé, mais aux époques madame éprouvoit ordinairement des
irritations dans les entrailles et nous étions à peu près au tems de cette
époque.

2^o Madame étoit sujette aux hémorroïdes et dans ce
même tems nous observâmes chez plusieurs personnes que
le sang hémorroïdal occasionnoit beaucoup de dérangement
de santé.

Ces considérations nous firent attribuer ces nouveaux
accidens, qui faisoient cruellement souffrir la malade, à l'une de
ces deux causes ou de toutes les deux, qui pourroient avoir produit
cet excès de sensibilité, et peut être une augmentation d'acrimoine

Dans les humeurs, ce qui nous fit espérer que cela seroit pas
de longue durée: cependant ces souffrances cruelles durèrent
jusqu'au 12 juin & pour lors succédant elles commencèrent
à devenir moins violentes et elles finirent enfin huit ou
dix jours après.

On presume bien, sans doute sans qu'il soit besoin que je
le dise que cette inflammation, qui s'étendoit tout autour de
la playe à trois pouces n'exista pas si long-temps sans que la
peau fut enervée.

Les topiques anodins, huileux & aqueux, les absorbans, les
calmans intérieurs &c. tout fut mis en usage. On consulta plusieurs
maîtres de l'art, tant de la capitale, que de quelques autres
villes principales du royaume: tout fut inutile.

Le 28^e jour on aperçut pour la première fois quelques
globules de mercure parmi les matieres qui sortoient par la playe.

Le 29^e il en parut encore.

Seroit ce à ce minéral, je veux dire à sa décomposition et
à la combinaison de ses principes avec les matieres focales qu'on
pourroit attribuer ce des ordre? Tout ce qu'on peut dire à
l'appui de cette idée, c'est que les douleurs et l'inflammation
durèrent à peu près autant de temps qu'il parut du mercure,
ainsi qu'on le verra par la suite de ce détail.

Tous ces accidens étoient vraisemblablement un grand
obstacle au rétablissement des fonctions des intestins; aussi toutes
les matieres continuoient de passer par la playe.

Le 37^e jour depuis l'opération madame rendit par la
playe une once de mercure, sans compter celui qui peut se perdre.

Le lendemain deux verrées de petit lait dans lequel on
avoit délayé une once de pulpe de casse, la viderent abondamment
par la playe; mais le soir elle poussa une selle teinte par le
silectum de casse.

Le 40^e jour, il sortit deux onces de mercure. La nuit
suivante fut calme, cependant la malade éprouvoit depuis
deux, ou trois jours quelque légère perfrigeration et des
inquiétudes. Elle prit deux ou trois fois par jour quelque
verrée de decoction de quina et ces accidens cessèrent.

Le 41^e jour, sur le soir, madame poussa deux petites selles.

Le 42^e jour, Les excréments par la playe peu abondantes et dans la nuit il ne se fit par là aucune évacuation.

Le 43^e jour, journée très fâcheuse par la fréquence et l'abondance des excréments stercoreales par la playe. Le 44^e et le 45^e assez calmes.

Le 46^e jour, deux verrées de petit lait avec la casse produisirent une abondante évacuation par bas. Le 47^e calme.

Le 48^e jour (1^{er} juin) madame rendit du mercure dans une selle parmi quelque matière pelotonnée et griseâtre.

Depuis cette époque il sortit de temps en temps par le bas des matières plus ou moins dures qui occasionnoient, à raison de la difficulté qu'elles trouvoient pour franchir le resserrement de l'intestin leze, des douleurs de colique plus ou moins vives. Mais instruit par le savant et profond mémoire de M. Louis, j'osai assurer que ces matières ainsi consistantes devenoient utiles pour dilater ce passage. C'est dans ces mêmes vues qu'on avoit permis depuis quelques jours les aliments solides.

Le 12^e juin (59^e de l'opération) nous nous aperçûmes que l'inflammation diminueoit^{que}, les excoriations sechoient et qu'en conséquence la malade souffroit moins, quoique les matières fécales continuassent de sortir par la playe fort fréquemment et avec abondance.

On aura la bonté d'observer que depuis le 40^e jour on ne vit plus sortir du mercure par la playe, ~~et~~ qu'il en parut le 48^e par une selle et qu'on n'en aperçut plus.

Je le répéterai encore, puisque la diminution des irritations à la peau coïncident avec la cessation de la présence du mercure, ne pourroit on pas raisonnablement penser que ces accidens dépendoient de ce mineral?

À cette époque je discontinuai mes visites réglées chez la malade dont je n'étois pas le chirurgien ordinaire.

Depuis le 12 juin jusques au 19 (66^e jour depuis l'opération) quoiqu'il sortit toujours beaucoup de matière par la playe, cependant il en sortoit tous les jours beaucoup par la voie naturelle d'une consistance assez solide; mais le 19^e madame souffrit cruellement de la difficulté que les matières trouverent, tant pour suivre le canal intestinal que pour franchir l'ouverture de l'ombilic. ayant été appelée, je trouvai la playe presque



entièrement fermée. Je fus d'avis de la dilater un peu afin qu'elle servit de ^{decharge} jusqu'à ce que l'ouverture du boyau fut fermée, mais la malade s'y étant opposée. Je conseillai d'injecter quelque decoction dans la à travers la petite ouverture, afin de delayer les matieres qui se presentoient et leur faciliter par ce moyen la liberté de passer soit à travers l'étranglement du boyau, soit par l'ouverture extérieure dans la quelle on tiendrait une éponge préparée.

Avant de me retirer, je representai au medecin et au chirurgien ordinaires 1° L'avantage d'entretenir l'ouverture assés dilatée pour les raisons déjà exposées. 2° Le danger de la laisser fermer avant d'être assuré que la capacité de l'intestin dans le point étranglé fût suffisante pour permettre le passage aux matieres focales couristantes, et pour les en convaincre je leur rapportai, du profond memoire de M. Louis, tout ce qui peut être relatif à cet objet, et je me retirai pour aller porter un secours pressant à un de mes malades.

Le lendemain j'appris que madame étoit très mal. Je rencontrai le medecin qui me dit qu'il la regardoit comme perdue, et que par l'amas qui s'étoit fait des matieres focales au noubril, la tumeur étoit énorme. Il ajouta que rien ne sortoit par l'ouverture extérieure parce que la malade n'avoit jamais pu ou voulu supporter l'éponge ni l' injection que j'avois conseillée.

Le 24 je fus mandé encore. La tumeur avoit crevé. Je trouvais cette dame très alarmée; son pouls étoit à peine sensible, les yeux étoient murtris, la figure d'une couleur livide jaunâtre, elle vomissoit abondamment, ~~et~~ elle étoit tracassée par le hoquet, ^{elle} éprouvoit par temps des frissons irreguliers, et les urines étoient supprimées.

La tumeur fut pourtant vidée: La matiere étoit des plus fetides.

Cette situation avoit sans doute de quoi nous alarmer nous meme. Était elle l'effet d'une affection nerveuse ou bien

celui d'une gangrene intérieure ?

Dans l'incertitude où nous étions, nous employâmes les deux genres de moyens propres à combattre les deux causes à la fois. — une teinture de quina prise intérieurement, des injections et des fomentations à l'extérieur avec une forte decoction de la même écorce camphrée, des potions antispasmodiques, tels furent les remèdes qui furent administrés sans relâche.

Le 25 l'état du poulx, ainsi que celui du pauvre visage étoit changé sensiblement en mieux, mais les matières ne passaient plus par l'anus, et madame n'urinoit plus ni ne sentoit aucun besoin d'uriner.

Le 26, la secretion des urines se rétablit et madame urina; les matières qui passaient par la playe étoient plus épaisses, mais les bords de la playe s'enflammaient et devinrent très douloureux. On employa les calmans, les fomentations emollientes &c. La tumeur se dissipa enfin par la sortie des matières, le vomissement cessa, mais le hoquet persista encore deux jours, ce qui ne nous surprit pas parce que madame y étoit fort sujette (aussi en fut elle souvent atteinte pendant le cours de cette maladie), d'ailleurs tous les autres symptômes alarmans ayant cessé nous fûmes parfaitement rassurés.

Enfin tous les accidens s'étant enfin calmés, tout vint à souhait, le cours naturel des matières fécales se rétablit, la playe se consolida et dans une quinzaine de jours ensuite madame ^{atteignit} ~~atteint~~ le degré de guérison qu'un pareil accident peut comporter.

On observera que cette Dame étoit naturellement d'un bon appétit et qu'elle avoit un goût décidé pour tous les alimens les plus chauds et les moins digestibles, tels que le café au lait, les haricots, le jambon, les saucisses &c.

Pendant les huit mois qui suivirent sa guérison elle eut plusieurs fausses digestions parce qu'elle ne peut jamais gagner sur elle de modérer son appétit et moins encore de se server de nourriture malsaine. Elle éprouvoit aussi par tous des douleurs au nombril et des coliques déterminées sans doute par la difficulté avec laquelle les matières fécales passaient à travers l'étranglement. Inutilement lui représentoit-on le danger qu'elle couroit en se



permettant de tels alimens et en en prenant trois à la fois.

Un jour elle voulut aller passer quelques jours à une campagne distante de trois lieues de la ville. Elle y fut en voiture. à son arrivée elle voulut manger d'une soupe de cuisine faite avec des haricots; elle ajouta à cela de la sauce et un peu de café au lait. Elle en eut une indigestion suivie d'un tel dérangement que la cicatrice du boyeau creva et des matieres se repandirent sous la peau et y formèrent une tumeur considerable. On negligea de l'ouvrir. la fièvre se mit de la partie et madame mourut.

Le Medecin ordinaire^{qui} fut appelle pour se joindre à un autre medecin de merite qui étoit sur les lieux et a un chirurgien du voisinage, me dit que la fièvre étoit une véritable fièvre putride maligne et qu'il ne doutoit pas que quand bien même la crevance n'eut pas eu lieu, elle n'en eut morte.

Le chirurgien ordinaire de cette dame fut appelle pour faire l'ouverture du cadavre avec celui qui avoit été d'abord appelle. ils rapportèrent qu'il n'y avoit point d'épanchement de matiere dans le bas-ventre, mais qu'on avoit trouvé de la confusion parmi les boyaux avec plusieurs adhérences entre eux, ils ajoutèrent que l'étranglement du boyeau lezé permettoit un libre passage au doigt.

Je ne me permettrais aucune reflexion ulterieur sur cette maladie. Je ne puis mieux faire que d'en referer au memoire profond de M. Louis dont la doctrine et les principes solides recoivent par cette observation une confirmation bien evidente d'utilité et de verité. /.

fin

